



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII  
ȘTIINȚIFICE  
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD  
310025 ARAD, Bd. Revoluției nr.94-96, tel. 0040/0257/280260,  
e-mail: [rectorat@uvvg.ro](mailto:rectorat@uvvg.ro), web: [www.uvvg.ro](http://www.uvvg.ro)

---

FACULTATEA DE MEDICINĂ

ÎNTREBĂRI PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE  
LICENȚĂ

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ  
GENERALĂ

TESTE DE LICENȚĂ

1.Scopul sondajului este:

- a. evacuarea conținutului
- b. evidențierea cavității conținutului
- c. recoltarea produsului
- d. stabilirea diagnosticului
- e. stabilirea conduitei terapeutice

Răspuns: a, c

2.Incidente și accidentele tubajului gastric sunt:

- a. vărsătura și greața
- b. ruperea sondei
- c. hemoragia digestivă
- d. încolăcirea sondei
- e. toate răspunsurile sunt adevărate

Răspuns: a, d

3. Poziția corectă a bolnavului, pentru efectuarea clismei evacuatorii este:

- a. în decubit dorsal
- b. în decubit lateral drept
- c. în decubit lateral stâng, flexia coapsei stângi pe abdomen, iar membrul inferior drept întins
- d. orice poziție confortabilă a bolnavului
- e. decubit lateral drept cu ambele coapse flectate pe abdomen

Răspuns: a, c

4. Scopul sondajului vezical este:

- a. golirea vezicii urinare
- b. efectuarea procedurilor terapeutice
- c. hidratarea vezicii urinare
- d. de a insufla aer în vezica urinară
- e. de a vizualiza interiorul vezicii urinare

Răspuns: a, b

5. Incidentele și accidentele sondajului vezical sunt:

- a. lezarea mucoasei uretrale și vezicale
- b. ruperea sondei vezicale
- c. încolăcirea sondei
- d. crearea de căi false
- e. toate răspunsurile sunt adevărate

Răspuns: a, d

6. Acțiunea unui medicament depinde de:

- a. structura sa chimică
- b. persoana căreia îi este administrată
- c. forma de administrare
- d. doza de administrare
- e. intervalul de timp în care este administrat

Răspuns: a, d, e

7. Injecțiile intramusculare se efectuează în regiunile:
- a. supero-externă a mușchilor fesieri
  - b. mușchilor interni ai coapsei
  - c. mușchilor posteriori ai coapsei
  - d. regiunea externă a deltoidului
  - e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, d

8. Trusa asistentei medicale va cuprinde:
- a. seringi de toate mărimile
  - b. stetoscop și tensiometru
  - c. termometre
  - d. aparat EKG
  - e. laringoscop

Răspuns: a, b, c

9. Poziția în pat a bolnavului vârstnic, va fi stabilită de:
- a. medic
  - b. și-o alege singur
  - c. medic și asistentă, în funcție de afecțiune
  - d. și-o alege singur cu acordul medicului
  - e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: b, c, d

10. Compresele reci au acțiune:
- a. hipotermizantă
  - b. analgetică
  - c. anticoagulantă
  - d. antiinflamatoare
  - e. antiemetic

Răspuns: a, b, d

11.Efectul căldurii asupra organismului are următoarele acțiuni:

- a. antispastică
- b. calmantă
- c. hipertensivă
- d. scade metabolismul celular
- e. anticoagulant

Răspuns: a, b

12.Factorii declanșanți ai degerăturilor sunt:

- a. frigul
- b. îmbrăcămintea și încălțăminte neadecvată
- c. tratament cu unele medicamente
- d. oboseală
- e. căldura alternând cu frigul

Răspuns: a, b

13.Plăgile mușcate pot fi:

- a. zgârâieturi
- b. înțepături
- c. eritem
- d. flictene
- e. plăgi închise

Răspuns: a, b, e

14.Examenele biologice, în cazul mușcăturii de viperă, arată:

- a. leucocitoză
- b. trombocitopenie
- c. fibrinogen crescut
- d. proteinemie crescută
- e. hipocalcemie

Răspuns: a, b

**15.**Clinica hiperhidratării se manifestă prin:

- a. delir, halucinații, convulsii
- b. hipotensiune arterială
- c. icter
- d. edeme
- e. semnul pliului prezent

Răspuns: a, d

**16.**Semnele, de certitudine, ale unei fracturi sunt:

- a. edemațierea segmentului fracturat
- b. sufuziunile sanguine
- c. poziția anormală a segmentului fracturat
- d. crepitația osoasă
- e. mobilitate normală a segmentului fracturat

Răspuns: c, d

**17.**Simptomele insolației sunt:

- a. cefalee
- b. fotofobie
- c. hipotensiune arterială
- d. transpirație
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

**18.**Atelele care fixează fractura, trebuie să îndeplinească următoarele reguli:

- a. să fie solide
- b. să depășească fractura
- c. să cuprindă două articulații
- d. să fie elastice
- e. să fie mobile

Răspuns: a, c

**19.**Durerea în fracturi se combate prin:

- a. administrarea de analgetice
- b. infiltrații locale și de plex cu analgetice locale
- c. administrare de somnifere
- d. administrare de sedative
- e. administrare de tranchilizant

Răspuns: a, b

**20.**Aspirația de apă dulce produce:

- a. hemodiluție, în 3 – 4 minute
- b. hipernatremie
- c. hemoliză
- d. fibrilație ventriculară
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c

**21.**Medicația din dulapul de urgență este gestionată direct de:

- a. medic
- b. asistenta șefă
- c. o asistentă destinată pentru acest scop
- d. asistenta de salon
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: b, c

**22.**Calea cea mai eficientă de administrare a medicamentelor este:

- a. calea bucală
- b. calea parenterală
- c. prin mucoasa respiratorie
- d. prin injectare intracardiacă
- e. pe sonda de intubație

Răspuns: a, b

**23.**Un aparat gipsat, incorect aplicat, favorizează:

- a. necroze
- b. paralizii
- c. administrare obligatorie de antibiotice
- d. infecții
- e. vindecare prematură

Răspuns: a, b

**24.**La bolnavul internat în spital, se monitorizează permanent:

- a. TA, circulația, pulsul
- b. respirația, culoarea tegumentelor, temperatura
- c. scaune
- d. poziția în pat în timpul somnului
- e. poziția membrelor

Răspuns: a, b

**25.**Pregătirea aparaturii medicale de specialitate, o are în sarcină:

- a. medicul
- b. asistenta medicală de salon
- c. asistenta șefă
- d. tehnicianul care o are în service
- e. medicul și tehnicianul care o are în service

Răspuns: b, c

**30.**Tratamentul local în arsuri îl efectuează:

- a. numai medicul specialist
- b. numai asistenta medicală
- c. medicul împreună cu asistenta medicală, în condiții de asepsie
- d. medicul chirurg, anestezistul și asistenta medicală cu condiția de asepsie perfectă
- e. medicul în condiții de asepsie

Răspuns: c, d

**31.**Alimentația bolnavului ars cuprinde:

- a. regim bogat în lichide, vitamine, săruri minerale
- b. alimentație mixtă care să cuprindă toate principiile recomandate de medic
- c. nu există restricții alimentare
- d. alimentație bogată în lipide și glucide
- e. nici un răspuns nu este corect

Răspuns: a, b

**32.**În fața bolnavului muribund, asistenta medicală are sarcina:

- a. nu va părăsi nici o clipă bolnavul
- b. părăsește bolnavul numai dacă el dorește
- c. poate părăsi bolnavul dacă el este inconștient
- d. părăsește bolnavul dacă se găsește deasupra resurselor terapeutice
- e. nu are nici o sarcină

Răspuns: a, b

**33.**Semnele sigure ale decesului sunt:

- a. petele (lividitățile) cadaverice
- b. rigiditatea
- c. oprirea respirației
- d. oprirea circulației
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: c, d

**34.**Saloanele, în secția de Terapie Intensiva sunt grupate astfel:

- a. saloane septice
- b. saloane aseptice
- c. saloane de postoperator
- d. saloane de preoperator
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b



35.Scopul internării bolnavului, în secția de Terapie Intensiva este:

- a. pentru restabilirea funcțiilor vitale
- b. pentru echilibrarea și stabilizarea hemodinamică, respiratorie și metabolică
- c. pentru a completa tratamentul incomplet efectuat pe alte secții
- d. pentru a stabili diagnosticul corect
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

36.Bolnavul critic, este internat pe secția Terapie Intensiva pe o perioadă de:

- a. până este compensat hemodinamic și metabolic
- b. până la stabilizarea funcțiilor vitale
- c. numai până la 21 zile
- d. maximum 48 ore
- e. maxim 12 ore

Răspuns: a, b

37.Poziția dorsală a bolnavului în pat, cea mai eficientă și cea mai recomandată, se găsește în afecțiunile:

- a. boli hepatice
- b. pancreatita acută
- c. insuficiența cardiacă
- d. hemoragia digestivă
- e. insuficiența respiratorie

Răspuns: a, b

38.Alimentația la bolnavul hepatic se face:

- a. fracționată în mese mici care să cuprindă kaloriile necesare
- b. fracționată cu mese mici și dese
- c. se face numai endovenos
- d. se administrează numai o masă copioasă pe zi
- e. nu există restricții alimentare

Răspuns: a, b

39. Semnele clinice ale unei hemoragii digestive mari sunt:

- a. paloare, amețeli, cefalee, frisoane
- b. somnolența, adinamie, apatie
- c. neliniște, agitație, hipotensiune, tahicardie
- d. tegumente hiperemice
- e. hipertensiune arterială

Răspuns: a, c

40. Poziția în pat, cea mai indicată a bolnavului pulmonar este:

- a. semișezândă
- b. și-o alege singur
- c. decubit lateral drept
- d. în decubit ventral
- e. decubit lateral stâng

Răspuns: a, b

41. În cazul bolnavilor cardiaci, în criză, până la sosirea medicului, asistenta medicală are voie să administreze:

- a. digoxin
- b. O<sub>2</sub>,
- c. Nitroglicerină
- d. analgetic
- e. medicație hipotensoare

Răspuns: b

42. Locul indicat pentru probele de explorări funcționale la bolnavul cardiac este:

- a. în camera de explorări funcționale
- b. în salon
- c. oriunde
- d. în camera de tratamente
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

43. Supravegherea bolnavilor renali de către asistenta medicală pretinde urmărirea:

- a. bilanțului hidric
- b. echilibrului acido-bazic
- c. diureza
- d. alimentele ingerate
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c

44. Pentru dializa peritoneală materialele necesare sunt pregătite de :

- a. medicul nefrolog
- b. asistenta medicală
- c. bolnav, împreună cu asistenta medicală
- d. medic și asistentă
- e. numai de asistenta medicală

Răspuns: b, c

45. Bolile tubului digestiv sunt date de:

- a. factori alimentari și factori infecțioși
- b. factori climatici
- c. factori parazitari sau nervoși
- d. nu se cunoaște exact cauza
- e. factori chimici

Răspuns. a, c, e

47. Poziția cea mai corectă a bolnavului cu pancreatită acută este:

- a. poziția dorsală
- b. poziția antalgică care și-o alege bolnavul
- c. nu există stabilită o poziție
- d. poziție ventrală
- e. poziție semișezândă

Răspuns: a, b

**48.**Supravegherea bolnavului hepatic presupune:

- a. urmărirea culorii tegumentelor și sclerelor
- b. pruritul, culoarea scaunelor și apariția fetorului hepatic
- c. urmărirea mișcărilor acestuia
- d. urmărirea alimentației bolnavului
- e. urmărirea limbajului

Răspuns: a, b

**49.**Alimentația bolnavului cardiac va cuprinde:

- a. alimente cu conținut crescut în sodiu
- b. alimente care să cuprindă toți compușii principali ai alimentației
- c. alimente bogate în vitamine și săruri minerale
- d. alimentație hiperglucidică
- e. alimente bogate în grăsimi vegetale

Răspuns: b, c

**50.**În afecțiunile otice, când pavilionul urechii este afectat, el va fi șters cu:

- a. tamponane sterile de vată sau înmuiate în alcool
- b. tamponane sterile înmuiate în iod
- c. tamponane sterile de vată înmuiate în apă oxigenată
- d. tamponane sterile de vată înmuiate în alcool iodat
- e. tamponane sterile de vată înmuiate în oxicianură de mercur

Răspuns: a, c

**51.**Saloanele unde se află bolnavi care și-au pierdut parțial sau total vederea, există următoarele particularități:

- a. ușile saloanelor, băilor, wc-urilor, sălilor de tratament sunt deschise
- b. ușa salonului larg deschisă
- c. pragurile ușilor să fie cât mai înalte
- d. poziția mobilierului va fi mereu schimbată
- e. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, b

52. După expirarea perioadei de imobilizare a bolnavului cu infarct miocardic, mobilizarea sa se începe astfel:

- a. în faza incipientă prin mișcări pasive ale extremităților
- b. se începe cu mișcări active ale extremităților
- c. după mișcărilor pasive urmează mișcărilor active sub controlul pulsului și tensiunii arteriale
- d. se începe mobilizarea prin exerciții fizice cu efort dozat, sub conducerea asistentului medical
- e. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c

53. Bolnavii renali se internează în saloane:

- a. izolate, ferite de frig, călduroase, fără curenți de aer, la temperaturi de  $20 - 22C^0$
- b. amplasați la adăpost de infecții
- c. nu necesită izolare, deoarece nu sunt bolnavi contagioși
- d. se internează în saloane mari
- e. în saloane mici

Răspuns: a, b

56. Tratamentul intensiv al șocului, se face corect în următoarele situații:

- a. în cazul în care tratamentul se adresează cauzei declanșatoare
- b. numai când se respectă algoritmul tratamentului șocului
- c. în cazul în care tratamentul respectă etapa evolutivă în care se găsește bolnavul
- d. tratamentul se face numai când bolnavul a ajuns la spital
- e. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c

- 57.**Îngrijirea bolnavilor arși se face în funcție de:
- a. gradul arsurii, extinderea și localizarea ei
  - b. se face numai în funcție de gradul arsurii
  - c. vârsta bolnavului, starea generală a lui și procentul de arsură
  - d. în funcție de gradul de dotare a spitalului unde este internat
  - e. în funcție de temperatura pe care o prezintă bolnavul

Răspuns: a, c

- 59.\***Care din următoarele domenii nu face parte din definirea conceptului de calitate a vieții ?
- a. fizic: simptomele bolii și reacțiile la tratament
  - b. psihologic: starea mentală de sănătate pozitivă
  - c. spiritual: necesitatea fundamentală a omului de a da un scop și un înțeles vieții
  - d. economic: asigurarea condițiilor materiale de existență și tratament
  - e. social: calitatea relațiilor interumane

Răspuns: d

- 60.\***Care este metoda, prin care se precizează diagnosticul de malignitate?
- a. metoda imagistică
  - b. examenul citologic
  - c. examenul histologic
  - d. metoda endoscopică
  - e. metodele biochimice

Răspuns: c

- 61.\***Riscul de apariție al cancerului după oprirea fumatului:
- a. nu este modificat
  - b. este modificat numai după 15 ani
  - c. scade în primii 4 ani și rămâne crescut în continuare
  - d. devine egal cu populația generală după 10-15 ani
  - e. este diminuat numai prin chimioprofilaxie

Răspuns: d

**62.\***Modificarea regimului alimentar permite o reducere a incidenței cancerelor cu:

- a. cca. 20%
- b. cca. 30%
- c. cca. 40%
- d. cca. 50%
- e. cu 60%

Răspuns: b

**63.**Care din localizările de mai jos se situează în primele 6 cauze de morbiditate și mortalitate oncologică în țara noastră ?

- a. colon și rect la bărbați
- b. stomac
- c. plămân l
- d. tiroidă la femei
- e. tumoră ORL la femei

Răspuns: a, b, c

**64.**Perioada de securitate relativă în urmărirea bolnavului oncologic:

- a. începe din momentul primului tratament, dacă acesta a fost radical
- b. urmează primilor 5 ani de după tratament
- c. corespunde diminuării progresive a riscului de deces prin cancer
- d. bolnavul este considerat vindecat și scos din evidență
- e. bolnavul urmează tratament adjuvant intermitent

Răspuns: b, c

**65.**Reducerea aportului de calorii alimentare și a obezității poate avea un rol profilactic în:

- a. cancerul de corp uterin
- b. cancerul ovarian
- c. cancerul mamar
- d. cancerul gastric
- e. cancerul de prostată

Răspuns: a, c, e

**66.**Vârsta influențează considerabil apariția și localizarea cancerului. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate ?

- a. frecvența cancerului crește rapid după 40 ani
- b. frecvența maximă este sub 40 de ani
- c. influența vârstei se manifestă numai la femei
- d. vârsta influențează numai structura pe localizări, nu și frecvența
- e. în țara noastră, mortalitatea oncologică maximă se înregistrează la grupele de vârstă sub 65 ani

Răspuns: a, e

**67.\***În care din localizările de mai jos nu s-au identificat factori etiologici alimentari?

- a. cancerul gastric
- b. cancerul hepatic primitiv
- c. cancerul renal
- d. cancerul de rinofaringe
- e. cancerul de endometru

Răspuns: c

**68.**Creșterea consumului de fibre vegetale și fructe poate reduce semnificativ riscul pentru cancer la care din următoarele localizări?

- a. vezica urinară
- b. prostata
- c. stomacul
- d. colonul și rectul
- e. plămânul

Răspuns: c, d, e

**69.**Pentru care din localizările de mai jos a fost demonstrat rolul cancerigen al virusurilor ?

- a. rinofaringe
- b. tiroidă
- c. col uterin
- d. ficat
- e. plămân

Răspuns: a, c, d



**70.**Localizările tumorale, pentru care s-a stabilit o cauză hormonală, sunt următoarele:

- a. col uterin
- b. testicol
- c. hipofiză
- d. os
- e. corp uterin

Răspuns: b, d, e

**71.**Patul de spital trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- a. să fie comod și să-i asigure relaxarea
- b. să se poată așeza la marginea patului
- c. partea utilă cu înălțimea de 80cm
- d. partea utilă cu înălțimea de 60cm
- e. să fie accesibil din toate laturile

Răspuns: a, b, d, e.

**72.**Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:

- a. saltele antidecubit
- b. perne pufoase
- c. saltele pneumatice compartimentate
- d. saltele cu apă
- e. nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d.

**73.**Poziția semișezândă a bolnavului în pat este indicată în situații de:

- a. afecțiuni cardiace și pulmonare
- b. după unele intervenții chirurgicale
- c. bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice
- d. convalescență
- e. colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d.

74. Mobilizarea bolnavilor după ședere îndelungată la pat se efectuează, controlând:

- a. pulsul
- b. tensiunea arterială
- c. frecvența respirației
- d. diureza
- e. curba ponderală

Răspuns: a, b, c.

75. Îngrijirea cavității bucale la bolnavii inconștienți se face cu:

- a. lichid de gargară în cantitate suficientă
- b. tampon îmbibat în glicerină boraxată
- c. pastă de dinți
- d. tampon îmbibat în zeamă de lămâie
- e. albastru de metil

Răspuns: b, d.

76. Poziția forțată a bolnavului în pat poate avea următoarele cauze:

- a. reacție de apărare conștientă sau inconștientă a organismului
- b. măsură terapeutică
- c. măsură profilactică
- d. modificări patologice produse de boală
- e. impusă de personalul medical de îngrijire

Răspuns: a, b, c, d.

77. Factorii favorizanți locali pentru apariția escarelor de decubit pot fi:

- a. umezeală locală (urină, fecale, diverse secreții)
- b. imobilizare în aceeași poziție, timp mai îndelungat
- c. folosirea de pudră de talc
- d. căldură umedă excesivă
- e. neregularități ale lenjeriei de pat și de corp

Răspuns: a, b, d, e.

**78.**Tratamentul escarelor se efectuează prin:

- a. căldură umedă locală
- b. crearea unui mediu local uscat și cât se poate de steril
- c. medicație locală epitelizantă
- d. aplicări locale de antibiotice și pomezi revulsive
- e. tratament chirurgical

Răspuns: b, c, d, e.

**79.**Sarcinile asistentului medical în pregătirea și asistarea examinărilor clinice, sunt:

- a. pregătirea psihică a bolnavului
- b. dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului
- c. deservirea medicului cu instrumentar
- d. purtarea de discuții cu bolnavul, în timp ce îl examinează medicul
- e. așezarea bolnavului în pat după examinare și facerea patului

Răspuns: a, b, c, e.

**80.**Pentru tușeul rectal, poziția bolnavului poate fi:

- a. șezândă
- b. genu-pectorală
- c. ginecologică (la femei)
- d. decubit lateral, cu coapsele flectate pe abdomen
- e. indiferentă

Răspuns: b, c, d

**81.**Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:

- a. scurt istoric al bolii
- b. pulsul
- c. temperatura
- d. tensiunea arterială
- e. diureza

Răspuns: b, c, d, e.

**82.**Paloarea instalată rapid poate ascunde:

- a. hemoragie masivă urinară (hematurie)
- b. hemoragie ocultă
- c. hemoragie digestivă superioară (hematemeză, melena)
- d. stare febrilă
- e. hemoragie respiratorie (hemoptizie)

Răspuns: a, c, e.

**83.**Pe foaia de temperatură se menționează cu:

- a. steluță - frisonul
- b. săgeți roșii - transfuziile de sânge sau preparate sanguine
- c. linie roșie întreruptă - temperatura
- d. linie albastră continuă - pulsul
- e. coloane roșii - tensiunea arterială

Răspuns: a, b, e.

**84.**Măsurarea pulsului la pacientul internat se face :

- a. în repaus fizic și psihic
- b. după efort
- c. pe durata unui minut
- d. în șanțul radiar
- e. cel puțin o dată pe zi

Răspuns: a, c, d, e.

**85.**Produsele biologice normale, ce se pot recolta de la bolnavi, pot fi:

- a. sângele
- b. urina
- c. materiile fecale
- d. lichidul cefalo-rahidian
- e. lichidul de ascită

Răspuns: a, b, c, d.

**86.** Sângele pentru hemocultură se recoltează :

- a. de obicei seara
- b. în plin frison
- c. după începerea tratamentului antibiotic
- d. la cel puțin 24 ore de la terminarea tratamentului cu antibiotice
- e. indiferent când

Răspuns: b, d.

**87.** Recoltarea urinei se efectuează:

- a. de obicei dimineața
- b. în vase de sticlă cilindrice, gradate
- c. din urina strânsă în timpul nopții
- d. prin sondaj vezical, dar numai la copii și numai în scop diagnostic
- e. prin punșionarea sondei, la bolnavii cu sondă vezicală permanentă

Răspuns: a, b, e.

**88.** Cavitățile seroase, din care se pot recolta revărsate, pot fi:

- a. stomacul
- b. cavitatea pleurală
- c. cavitatea peritoneală
- d. pericardul
- e. cavitatea articulară

Răspuns: b, c, d, e.

**89.** Recoltarea de sânge capilar se practică pentru determinarea:

- a. tabloului sanguin
- b. cantitativă a hemoglobinei
- c. numărului de reticulocite
- d. timpului de sângerare și coagulare
- e. sideremiei

Răspuns: a, b, c, d

**90.** Testele cutanate alergice de diagnostic mai des folosite sunt:

- a. IDR-Mantoux - pentru TBC
- b. IDR-Burnet - pentru bruceloză
- c. IDR-Cassoni - pentru chistul hidatic
- d. Reacția Dick - pentru scarlatină
- e. IDR - pentru trichineloză

Răspuns: a, b, c, e

**91.** Pregătirea bolnavilor pentru examinarea radiologică înseamnă:

- a. asigurarea temperaturii corespunzătoare bolnavului dezbrăcat
- b. completarea biletului de trimitere de către medic
- c. înștiințarea serviciului de radiologie despre examinarea cerută
- d. transportul bolnavului, însoțit de asistenta de salon și documente medicale
- e. pregătirea psihică a bolnavilor

Răspuns: a, c, d, e

**98.** Examinarea radiologică a colonului, cu metoda dublului contrast, poate evidenția:

- a. stenoze
- b. polipi
- c. tumori
- d. diverticuli
- e. hernie hiatală

Răspuns: a, b, c, d

**99.** Pregătirea pentru examinarea ultrasonografică a abdomenului presupune:

- a. administrarea unei medicații absorbante a gazelor
- b. cu cel puțin 24 de ore înainte, bolnavul rămâne nemâncat
- c. pentru examinarea organelor din micul bazin, vezica urinară golită
- d. medicație purgativă, la nevoie
- e. ingerarea a 500-700 ml de lichide, cu 30 minute înainte de examinare

Răspuns: a, d

**100.**Endoscopia se folosește în examinarea organelor cavitare, cum ar fi:

- a. esofagul
- b. stomacul
- c. rectul
- d. colonul
- e. colecistul

Răspuns: a, b, c, d

**101.\***Căile de administrare ale medicamentelor pot fi:

- a. în aplicații locale
- b. pe cale bucală
- c. sub formă de injecții
- d. în administrări intracavitare
- e. toate răspunsurile de mai sus

Răspuns: e

**102.\***Repausul fizic relativ înseamnă că bolnavul:

- a. stă la pat majoritatea timpului, coborând numai pentru necesități personale
- b. se scoală din pat pentru necesități personale și plimbări progresive de recuperare
- c. nu părăsește patul decât în orele de vizită
- d. nu părăsește patul deloc
- e. ține în repaus numai anumite părți ale corpului

Răspuns: b

**103.**Repausul intelectual se recomandă în:

- a. hepatita acută
- b. cardiopatii
- c. nevroze
- d. fracturi cu imobilizare
- e. psihoze

Răspuns: a, b, c, e

**104.**Alimentația bolnavului urmărește:

- a. acoperirea cheltuielilor energetice de bază ale organismului
- b. asigurarea aportului de săruri minerale, vitamine și microelemente
- c. câștig ponderal de cel puțin 10% din greutate
- d. favorizarea vindecării
- e. asigurarea principiilor alimentare după toleranța și opțiunea pacientului

Răspuns: a, b, d

**105.**Necesitățile calorice în repausul absolut la pat sunt de:

- a. 15 calorii/kilo-corp în 24 h
- b. 20 calorii/kilo-corp în 24 h
- c. 25 calorii/kilo-corp în 24 h
- d. cu 10-15% mai mici la bătrâni și la copii
- e. cu 20-30% mai mari în secțiile de pediatrie

Răspuns: c, e

**106.**Necesitățile calorice crescute se impun în:

- a. stări febrile, cu 13% pentru fiecare grad de temperatură
- b. distrucții de țesuturi, care necesită un aport caloric suplimentar de 10%
- c. boli cu metabolism crescut
- d. cașexia neoplazică
- e. stări de agitație și/ sau contracții musculare, până la 30%

Răspuns: a, b, c, e

**107.\***Regimul alimentar al bolnavului trebuie să asigure următoarele necesități calitative:

- a. hidrați de carbon în cantități nelimitate
- b. proteine de origine animală
- c. vitamine liposolubile
- d. grăsimi de origine vegetală
- e. toate principiile alimentare, în proporție calculată, după necesarul individual (după boală)

Răspuns: e



**108.**Rolul proteinelor în organism este complex, ele participând la:

- a. sinteza și secreția de hormoni și enzime
- b. reglarea parțială a tensiunii arteriale
- c. acoperirea parțială a nevoilor energetice
- d. buna funcționare a sistemului imunitar
- e. menținerea presiunii coloid-osmotice a sângelui (prevenirea și combatere edemelor)

Răspuns: a, c, d, e

**109.**Aplicațiile reci au efect:

- a. tonifiant
- b. stimulator
- c. regenerativ
- d. anesteziant până la necroză, la sistemul nervos central
- e. antispastic

Răspuns: a, b, c, d.

**110.**Frigul, sub formă uscată, se poate aplica, ca și:

- a. pungi cu gheață prin intermediul unui prosop, flanel
- b. pungi cu gheață direct pe piele, în anumite situații de urgență
- c. recipiente speciale din cauciuc sau metal
- d. crioterapie în spasme vasculare, glomerulonefrită acută, infecții urinare
- e. hidrofoare

Răspuns: a, c, e.

**111.**Compresele reci, ca și formă de aplicație umedă, se indică în:

- a. inflamații, edeme
- b. hemoragii
- c. ameliorarea durerilor localizate
- d. hipotermie
- e. stări febrile

Răspuns: a, b, c, e.

**112.\*Fricțiunile, ca metodă hidroterapeutică, se folosesc în caz de:**

- a. afecțiuni inflamatorii cutanate
- b. supurații
- c. reacții alergice
- d. flebite
- e. afecțiuni inflamatorii ale aparatului respirator

Răspuns: e

**113.Băile curative parțiale alternante se aplică:**

- a. pentru extremități
- b. în două vase: unul cu apă rece de 15-18°C, altul cu apă caldă de 40°C
- c. membrele, prima dată se introduc în apă rece timp de 20-60 secunde, apoi în cea caldă timp de 2-3 min.
- d. în 10-12 ședințe zilnice
- e. de 2-3 ori zilnic, în caz de hemoroizi

Răspuns: a, b

**114.Aplicațiile calde înseamnă:**

- a. folosirea de temperaturi cu cel puțin 5 grade peste cea indiferentă
- b. obținerea de efecte antispastice
- c. efect hipotensor prin vasodilatație periferică
- d. aplicarea căldurii uscate direct pe țesuturi
- e. comprese fierbinți la 45-55°C

Răspuns: b, c, d, e

**115.Cataplasmele umede, cu substanțe păstoase vegetale se aplică în:**

- a. infecții ale țesutului celular subcutanat
- b. afecțiuni ORL
- c. mialgii, artralгии, spasme musculare
- d. colecistită acută flegmonoasă
- e. artrite subacute și cronice

Răspuns: a, b, c, e.

**116.\***Băile calde se folosesc:

- a. sub formă de băi calde obișnuite, la temperatura de 45-50°C
- b. sub formă de băi fierbinți, la temperatura de peste 50°C, cu durată de 60 de minute
- c. în stări febrile
- d. în afecțiuni acute articulare
- e. în hipotermii

Răspuns: e.

**117.**Petele de mușegăi de pe lenjerii se curăță cu:

- a. amoniac
- b. oxalat de sodiu 20%
- c. apă
- d. clor
- e. alcool

Răspuns: a, b, c

**118.**Petele de gudron se curăță cu:

- a. albastru de metil
- b. aăpun
- c. aterebentină
- d. benzină
- e. alcool

Răspuns: b, c, d, e

**119.**Petele de fructe se curăță cu:

- a. lapte dulce
- b. soluție de bisulfid de sodiu acidificat cu acid clorhidric
- c. apă
- d. alcool
- e. benzină

Răspuns: a, b, c

**120.**Petele de iod se curăță cu:

- a. hidroxid de amoniu
- b. tiosulfat de sodiu 10%
- c. apă
- d. vitamina C în soluție
- e. alcool

Răspuns: a, b, d

**121.**Pentru conservarea materialelor alterabile, frigiderul are rolul de:

- a. a împiedica degradarea acestora
- b. a schimba compoziția acestora
- c. a reduce sau a opri dezvoltarea microorganismelor
- d. a asigura stabilitatea medicamentelor termolabile
- e. a asigura păstrarea vitaminelor în fructe și legume

Răspuns: a, c, d, e

**122.**Întreținerea frigiderelor din saloane constă din:

- a. dezăpezire la 10-20 de zile
- b. se spală tot interiorul cu apă caldă
- c. se lasă deschis să se usuce după spălare
- d. garniturile de etanșeizare ale ușii se spală separat
- e. se spală cu alcool

Răspuns: a, b, c, d

**123.**În lipsa tărgilor, transportul primar al pacienților se poate face cu mijloace improvizate:

- a. scaun cu spătar
- b. pătură
- c. sac de plastic
- d. covor
- e. palton fixat pe bază de lemn

Răspuns: a, b, d, e

124. Transportul secundar și cel în incinta spitalului este obligatoriu la următoarele categorii de bolnavi:

- a. bolnavi în stare de șoc
- b. bolnavi cu stare generală bună
- c. bolnavi suspecti sau confirmați cu infarct miocardic
- d. bolnavi cu afecțiuni ale membrilor inferioare
- e. bolnavi cu insuficiență cardio-pulmonară gravă

Răspuns: a, c, d, e

125. În cursul transportului prematurului, asistenta însoțitoare va urmări în permanență funcțiile vitale ale acestuia:

- a. diureza
- b. respirația
- c. circulația
- d. termoreglarea
- e. pulsul

Răspuns: b, c, d, e

126. Tăvița renală se poate folosi pentru:

- a. colectarea urinei
- b. colectarea materiilor fecale
- c. captarea vărsăturilor
- d. strângerea tamponelor
- e. strângerea instrumentelor întrebuințate

Răspuns: c, d, e

127.\* Tuburile de cauciuc și de material plastic se utilizează ca și accesorii pentru diferite dispozitive:

- a. irigatoare
- b. aparate de alimentație artificială
- c. aparate de aspirație a secrețiilor
- d. transfuzii de sânge
- e. toate răspunsurile de mai sus.

Răspuns corect: e

**128.**Manopere, investigații și tratamente, ce se efectuează în decubit lateral, sunt:

- a. administrarea clismelor și a supozitoarelor
- b. consultul abdominal
- c. puncția lombară
- d. măsurarea temperaturii rectale
- e. sondajul vezical

Răspuns: a, d

**129.**Dispneea de repaus este o dispnee permanentă, care apare inclusiv în poziția de ortopnee; ea poate avea ca și cauză:

- a. tulburări de reglare centrală
- b. efortul fizic
- c. obstacol în căile respiratorii
- d. tulburări circulatorii
- e. mici sângerări

Răspuns: a, c, d

**130.**Dispneea de efort apare în:

- a. boli ale aparatului cardio-vascular
- b. anemii
- c. repaus
- d. somn
- e. tumori genitale

Răspuns: a, b.

**131.**Dispneea inspiratorie apare în:

- a. paralizia incompletă a mușchilor respiratorii
- b. obstacol al căilor respiratorii
- c. postprandial
- d. astm bronșic
- e. pneumonii

Răspuns: a, b, e

**132.**Poliuria durabilă apare în:

- a. diabet zaharat
- b. deshidratare
- c. stare febrilă
- d. scleroză renală
- e. diabet insipid

Răspuns: a, d, e.

**133.**Culoarea urinii depinde de:

- a. densitate
- b. cantitate
- c. unele boli
- d. băuturi colorate, acidulate
- e. expunere la soare a pacientului

Răspuns: a, b, c.

**134.**Medicamente, care schimbă culoarea urinii, sunt:

- a. Furazolidon
- b. Rifampicină
- c. Omeran
- d. Oxacilină
- e. Piramidon, Algocalmin

Răspuns: a, b, e

**135.\***Vărsături fecaloide apar în:

- a. hepatite
- b. infarct miocardic
- c. ocluzie intestinală
- d. pneumonii
- e. gastrite

Răspuns: c

**136.**Hematemeza – vărsăturile sangvinolente și de sânge pur se datorează unor:

- a. boli ale stomacului
- b. boli de sânge - coagulopatii
- c. tratamente anticoagulante
- d. pneumonii
- e. TBC pulmonar

Răspuns: a, b, c.

**137.**Elemente patologice apărute în scaun pot fi:

- a. apă
- b. mucus
- c. puroi
- d. sânge
- e. alimente parțial digerate

Răspuns: b, c, d.

**138.**Scăderea corporală rapidă apare în cazul:

- a. eliminării edemelor
- b. eliminării ascitei
- c. administrării unor diuretice
- d. după efort fizic
- e. unei diareei severe

Răspuns: a, b, c, e.

**139.**Se cântăresc zilnic pacienții cu:

- a. insuficiență cardiacă
- b. TBC pulmonar
- c. tratamente cu cortizon
- d. tratamente cu diuretice
- e. sindrom diareic

Răspuns: a, c, d, e



**140.\*Leucoreea este:**

- a. scaun cu sânge
- b. spută purulentă
- c. secreție nazală patologică
- d. secreție vaginală patologică
- e. scurgere sangvinolentă vaginală

Răspuns: d.

**141.Paloarea persistentă poate avea ca și cauză:**

- a. anemia
- b. icterul
- c. irigația insuficientă cronică a pielii
- d. efortul
- e. bolile consumptive

Răspuns: a, c, e.

**142.Roșeața intensă a pielii poate să apară în:**

- a. febră
- b. emoții
- c. efort fizic
- d. anemii
- e. șoc hemoragic

Răspuns: a, b, c

**143.Erupțiile cutanate se pot întâlni în:**

- a. icter
- b. anemii
- c. reacții alergice
- d. boli infecțioase
- e. alergii medicamentoase

Răspuns: c, d, e

**144.**Sunt considerate mișcări involuntare următoarele:

- a. Miocloniile
- b. torticolisul
- c. tremurăturile
- d. flexia antebrățului
- e. mișcările coreice

Răspuns: a, c, e

**145.\***Epistaxisul este:

- a. hemoragie vaginală
- b. urină hipercromă
- c. scurgere patologică din cavitatea auriculară
- d. sângerare din cavitatea nazală
- e. sângerarea gingiilor

Răspuns: d

**146.\***La bolnavii alcoolici, semnul major al abstenenței este:

- a. paloarea
- b. roșeața
- c. tremurăturile grosolane, generalizate
- d. transpirații
- e. setea

Răspuns: c

**147.\***Intradermoreacția se efectuează:

- a. pe suprafața de flexie a antebrățului
- b. pe zona fesieră
- c. pe pielea păroasă a capului
- d. pe lobul urechii
- e. pe tegumente abdominale

Răspuns: a.

**148.**Examinarea radiologică a colonului se efectuează prin:

- a. irigografie
- b. endoscopie
- c. Rx nativ
- d. tușeu rectal
- e. laparotomie

Răspuns: a, c

**149.**Examenul radiologic al rinichilor se poate efectua prin:

- a. radiografie simplă
- b. urografie
- c. pielografie ascendentă
- d. ecografie
- e. pasaj baritat

Răspuns: a, b, c

**150.\***Cu ajutorul bronhoscopului se poate examina:

- a. stomacul
- b. rinichii
- c. bronșiile
- d. esofagul
- e. laringele

Răspuns: c.

**151.**Rectul se examinează cu:

- a. laringoscop
- b. rectoscop
- c. bronhoscop
- d. tușeu rectal
- e. specul vaginal

Răspuns: b, d

**152.**Pentru efectuarea colposcopiei este necesară:

- a. masă ginecologică
- b. colposcop
- c. soluție lugol
- d. substanță de contrast
- e. soluție de acid acetic 3%

Răspuns: a, b, c, e

**153.\***Principiul echității în activitatea de nursing comunitar se referă la:

- a. nediscriminarea între pacienți;
- b. doar îngrijiri medicale;
- c. îngrijiri medicale și sociale;
- d. îngrijiri în sisteme de asigurări private;
- e. îngrijiri la domiciliu.

Răspuns: a

**154.**Nursingul comunitar are drept domeniu furnizarea de servicii de îngrijiri către:

- a. pacienți în mod individual;
- b. populație sănătoasă;
- c. pacienților din clinici;
- d. pacienți din centre medicale;
- e. elevi.

Răspuns: a, b, c, d, e

**155.**Elementele de îngrijire acordate de asistenții comunitari sunt:

- a. menținerea funcțiilor vitale;
- b. diagnosticul medical al afecțiunilor cronice;
- c. optimizarea somnului și odihnei;
- d. diagnosticul medical al afecțiunilor acute;
- e. procurarea hranei pacienților.

Răspuns: a, c

**156.**Activitatea asistenților comunitari este ghidată de următoarele principii:

- a. echitate;
- b. etică;
- c. cooperare internațională;
- d. remunerație;
- e. cerere-ofertă.

Răspuns: a, b

**157.**În luarea unor decizii etice, asistenții comunitari trebuie să urmărească:

- a. colectarea datelor;
- b. ierarhizarea priorităților;
- c. clasificarea socială a pacienților;
- d. atitudinea familiei;
- e. dovedirea statutului de asigurat.

Răspuns: a, b

**158.**Principiile avute în vedere de către asistenții comunitari în procesul de îngrijiri sunt:

- a. principiul beneficiului;
- b. principiul autonomiei;
- c. principiul calității;
- d. principiul perfecționării continue a cunoștințelor;
- d. principiul socializării.

Răspuns: c, d

**159.**Asistenții comunitari au rol în:

- a. îngrijirea primară;
- b. rezolvarea în mod independent a urgențelor medicale;
- c. îngrijirea pe termen lung;
- d. rezolvarea unor probleme juridice ale pacienților;
- e. intermedierea conflictelor din familiile pacienților.

Răspuns: a, c

- 160.\***Responsabilitățile generale ale asistenților comunitari în îngrijirile a. primare de sănătate sunt:
- b. diagnosticul medical al bolii acute;
  - c. prevenirea complicațiilor;
  - d. tratamentul bolii identificate;
  - d. modificarea tratamentului în absența unor rezultate satisfăcătoare;
  - e. diagnosticul medical al bolii cronice și prescrierea tratamentului.

Răspuns: b

- 161.**Responsabilitățile medicale ale asistenților comunitari în îngrijirile primare de sănătate sunt:
- a. supravegherea stării de sănătate a gravidei, lăuzei, sugarului;
  - b. diagnosticarea și tratarea bolilor acute;
  - c. prescrierea unor regimuri alimentare specifice vârstei și afecțiunii pacientului;
  - d. prevenirea complicațiilor;
  - e. internarea în spital a pacienților.

Răspuns: a, d

- 162.**Manifestările de dependență identificate de asistenții comunitari (semne sau simptome) în tulburările gândirii sunt:
- a. fuga de idei;
  - b. halucinațiile;
  - c. furia;
  - d. incoerența în vorbire;
  - e. coma.

Răspuns: a, d

- 163.**Tulburările afective ale pacienților pot fi:
- a. furia;
  - b. amnezia;
  - c. apatia;
  - d. logoreea;
  - e. sațietatea.

Răspuns: a, c

**164.**Tulburările activității motorii sunt:

- a. restrângerea activității;
- b. lentoarea ideativă;
- c. fuga de idei;
- d. agitația motorie;
- e. debilitatea mentală.

Răspuns: a, d

**165.**Tulburările inteligenței sunt:

- a. coma;
- b. debilitatea mentală;
- c. retardul mental;
- d. imbecilitatea;
- e. agitația psihomotorie.

Răspuns: b, c, d

**166.**Problemele posibile ale femeii gravide în primul trimestru de sarcină sunt:

- a. grețuri;
- b. vărsături;
- c. semne de fals travaliu;
- d. dispariția ciclului menstrual;
- e. travaliul adevărat.

Răspuns: a, b, d

**167.**Obiectivele activității asistenților comunitari pentru femeia gravidă sunt:

- a. să cunoască toate modificările ce apar în timpul sarcinii;
- b. să fie informată despre adaptările corpului său la sarcină;
- c. igiena corporală a nou-născutului;
- d. să primească toate informațiile cu privire la naștere și travaliu;
- e. internarea în Maternitate.

Răspuns: a, b, d

**168.**Obiectivele asistențelor comunitari în îngrijirea sugarului sunt:

- a. îngrijirea corporală;
- b. diagnosticul medical al bolilor acute;
- c. recomandări de alimentație;
- d. instruirea mamei;
- e. diagnosticul medical al bolilor cronice.

Răspuns: a, c, d

**169.**Obiectivele esențiale ale îngrijirii sugarului sunt:

- a. asistența efectivă;
- b. alimentația;
- c. călirea organismului;
- d. profilaxia rahitismului;
- e. procurarea lenjeriei.

Răspuns: a, c, d

**170.**Care dintre următoarele situații pot fi considerate contraindicații ale vaccinării:

- a. hipersensibilitate cunoscută;
- b. copii cu antecedente de boli acute;
- c. copii cu SIDA sau HIV;
- d. dezordini imunitare;
- e. starea de sănătate.

Răspuns: a, c, d

**171.\***Simptomele cognitive ale demențelor sunt:

- a. agitația;
- b. tulburări de memorie;
- c. tulburări de limbaj;
- d. tulburări de dispoziție;
- e. coma.

Răspuns: b



172. Calea de administrare a vaccinurilor poate fi:

- a. intradermic;
- b. intravenos;
- c. intramuscular;
- d. oral;
- e. intraauricular.

Răspuns: a, c, d

173. Rolul asistenților comunitari în trimestrul III de sarcină este să instruiască gravida în scopul:

- a. recunoașterii semnelor ce prevestesc nașterea;
- b. recunoașterii semnelor de sarcină;
- c. ameliorării anxietății;
- d. recunoașterea semnelor de debut ale travaliului;
- e. sarcinilor ulterioare.

Răspuns: a, c, d

174. La pacienții preșcolari și școlari asistenții comunitari urmăresc:

- a. dezvoltarea somatică;
- b. prevenirea accidentelor;
- c. dezvoltarea psihică;
- d. performanțele școlare;
- e. prezența la programul de studiu.

Răspuns: a, b, c

200. Hemoptizia se manifestă prin:

- a. sânge cu resturi alimentare;
- b. sânge aerat;
- c. anamneză pentru afecțiuni respiratorii;
- d. sânge roșu, proaspăt;
- e. sânge negru coagulat.

Răspuns: b, d

201. Criza de astm bronșic se manifestă prin:

- a. dispnee cu caracter expirator;
- b. dispnee cu caracter inspirator;
- c. tuse cu expectorație perlata;
- d. stare prodromală
- e. anurie.

Răspuns: a, c, d

202. Intervenția asistenților comunitari la bolnavul cu astm bronșic vizează:

- a. ajutarea pacientului pentru satisfacerea nevoilor fundamentale;
- b. hidratarea corespunzătoare a bolnavului;
- c. prescrierea tratamentului corespunzător simptomelor;
- d. educația pacientului privind prevenirea crizelor de astm;
- e. recomandarea perfuziei endo-venoase.

Răspuns: a, b, d

203. Manifestările clinice ale pneumoniei pneumococice sunt:

- a. leucocitoză cu neutropenie;
- b. frison unic solemn;
- c. junghi toracic;
- d. febră;
- e. VSH crescut.

Răspuns: b, c, d

204. \*Modificările clinice prezente în pneumonia bacteriană acută sunt:

- a. ASLO crescut;
- b. starea generală alterată;
- c. radiografie toracică cu modificări;
- d. examen spută cu pneumococi, streptococi;
- e. VSH creacut.

Răspuns: b

**205.**Obiectivele îngrijirii bolnavului cu pneumonie bacteriană acută sunt:

- a. combaterea infecției;
- b. cronicizarea lentă a bolii;
- c. îmbunătățirea respirației;
- d. prevenirea complicațiilor;
- e. vaccinarea obligatorie antipneumococică.

Răspuns: a, c, d

**206.**Intervențiile asistenților comunitari în pneumonia bacteriană acută sunt:

- a. umidificarea aerului;
- b. monitorizarea funcțiilor vitale;
- c. administrarea tratamentului medicamentos prescris;
- d. imobilizarea bolnavului la pat pe perioada bolii;
- e. comunicarea prognosticului bolii.

Răspuns: a, b, c

**207.**Circumstanțele de apariție a pleureziilor sunt:

- a. afecțiuni pulmonare;
- b. reumatism articular acut;
- c. hepatite acute virale;
- d. traumatismele;
- e. expunerea la radiațiile ultraviolete.

Răspuns: a, b, d

**208.**Asistența comunitară se adresează următoarelor categorii de persoane:

- a. cu dizabilități și boli cronice;
- b. cu nivel economic sub pragul sărăciei;
- c. salariaților cu asigurare medicală;
- d. su nivel educațional scăzut;
- e. nici una dintre aceste categorii.

Răspuns: a, b, d

**209.**Care dintre următoarele tipuri de criză pot fi identificate de asistenții comunitari:

- a. criza maturațională;
- b. criza situațională;
- c. criza catastrofică;
- d. criza socială;
- e. criza morală.

Răspuns: a, b, d

**210.**Care dintre următoarele activități pot fi cuprinse în stadiul de previzită la domiciliu pacientului:

- a. contactul social;
- b. pregătirea echipamentului necesar;
- c. efectuarea de rapoarte despre cazul investigat;
- d. îndepărtarea echipamentului contaminat;
- e. îndepărtarea reziduurilor menajere.

Răspuns: a, b, d

**211.**Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:

- a. saltele antidecubit
- b. perne pufoase
- c. saltele pneumatice compartimentate
- d. saltele cu apă
- e. nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d

**212.**Poziția semișezândă a bolnavului în pat este indicată în situații de:

- a. afecțiuni cardiace și pulmonare
- b. după unele intervenții chirurgicale
- c. bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice
- d. convalescență
- e. colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d

213. Mobilizarea bolnavilor după ședere îndelungată la pat se efectuează controlând:

- a. pulsul
- b. tensiunea arterială
- c. frecvența respirației
- d. diureza
- e. curba ponderală

Răspuns: a, b, c

214. Îngrijirea cavității bucale la bolnavii inconștienți se face cu:

- a. lichid de gargară în cantitate suficientă
- b. tampon imbibat în glicerina boraxată
- c. pastă de dinți
- d. tampon imbibat în zeamă de lămâie
- e. albastru de metil

Răspuns: b, d

215. Poziția forțată a bolnavului în pat poate avea următoarele cauze:

- a. reacție de apărare conștientă sau inconștientă a organismului
- b. măsură terapeutică
- c. măsură profilactică
- d. modificări patologice produse de boală
- e. impusă de personalul medical de îngrijire

Răspuns: a, b, c, d

216. Factorii favorizanți locali pentru apariția escarelor de decubit pot fi:

- a. umezeală locală (urina, fecale, secreții diverse)
- b. imobilizare în aceeași poziție timp mai îndelungat
- c. folosirea de pudră de talc
- d. căldură umedă excesivă
- e. neregularități ale lenjeriei de pat și de corp

Răspuns: a, b, d, e

**217.**Panglica metrică este utilizată pentru măsurarea:

- a. circumferința toracelui
- b. circumferința capului la vârstnici
- c. lungimea brațelor la sugari
- d. circumferința abdominală
- e. circumferința membrelor

Răspuns corect: a, d, e

**218.**Foarfecele folosite în domeniul sanitar pot fi:

- a. drepte
- b. curbe
- c. semicurbe
- d. frînte
- e. rotunjite

Răspuns corect: a, b, d

**219.**Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:

- a. scurt istoric al bolii
- b. pulsul
- c. temperatura
- d. tensiunea arterială
- e. diureza

Răspuns: b, c, d, e

**220.**Paloarea instalată rapid poate ascunde:

- a. o hemoragie masivă urinară ( hematurie )
- b. o hemoragie ocultă
- c. o hemoragie digestivă superioară ( hematemeza, melenă )
- d. stare febrilă
- e. o hemoragie respiratorie ( hemoptizie )

Răspuns: a, c, e

221.\*Fricțiunile, ca metoda hidroterapeutică, se folosesc în caz de:

- a. afecțiuni inflamatorii cutanate
- b. supurații
- c. reacții alergice
- d. flebite
- e. afecțiuni inflamatorii ale aparatului respirator

Răspuns: e

222.Aplicațiile calde înseamnă:

- a. folosirea de temperaturi cu cel puțin 5 grade peste cea indiferentă
- b. obținerea de efecte antispastice
- c. efect hipotensor prin vasodilatație periferică
- d. aplicarea căldurii uscate direct pe țesuturi
- e. comprese fierbinți la 45-55 °C

Răspuns: b, c, d, e

223.Cataplasmelor umede cu substanțe pastoase vegetale se aplică în:

- a. infecții ale țesutului celular subcutanat
- b. afecțiuni ORL
- c. mialgii, artralгии, spasme musculare
- d. colecistita acută flegmonoasă
- e. artrite subacute și cronice

Răspuns: a, b, c, e

224.Parametrii vitali care se urmăresc la bolnavul critic sunt:

- a. TA și alura ventriculară
- b. gradul de inteligență
- c. starea de conștiință
- d. respirația
- e. imagistica organelor vitale

Răspuns: a, c, d

225. Factorii care modifică valorile TA sunt:

- a. condițiile de cazare din spital necorespunzătoare
- b. cardio-vasculari
- c. renali
- d. peristaltica intestinală
- e. umorali

Răspuns: b, c, e

226. În funcție de vârstă valorile normale ale frecvenței pulsului, variază în felul următor:

- a. nou născut 130-140b/min.
- b. copil mic 120-140b/min.
- c. la 10 ani 80-90 b/min.
- d. la 20 ani 60-80 b/min.
- e. peste 60 ani 72-84 b/min.

Răspuns: a, d, e

227. În mod fiziologic pulsul se accelerează în următoarele situații:

- a. în timpul somnului
- b. în efort fizic
- c. în timpul digestiei
- d. când bolnavul este sedat
- e. în stres cu emoții

Răspuns: b, c, e

228. Măsurarea temperaturii corpului se face cu:

- a. termometru termoelectric
- b. termometru termomecanic
- c. termometru cu rezistență
- d. termometru termostatic
- e. termisoare

Răspuns: a, c, e



229. După gradul de hipertermie măsurată, în axilă reacția febrilă se împarte în următoarele categorii:

- a. temperatura normală 36-37°C
- b. temperatură subfebrilă 36,9-37°C
- c. temperatură moderată 37-38°C
- d. febră ridicată 39-41°C
- e. hiperpirexie 41-42°C

Răspuns: a, d, e

230. În cazul vărsăturilor se vor urmări:

- a. frecvența
- b. conținutul
- c. ritmul
- d. cantitatea
- e. alimentele

Răspuns: a, b, d

231. Expectorația poate fi:

- a. seroasă
- b. sero-muco-purulentă
- c. bilioasă
- d. pseudomembranoasă
- e. limfatică

Răspuns: a, b, d

232. Greutatea corporală apreciază și indică:

- a. cantitatea de apă existentă în organism
- b. starea de nutriție
- c. stabilirea dozei terapeutice de medicamente
- d. evoluția bolnavului
- e. ritmul perfuziei

Răspuns: b, c, d

233. Monitorizarea comportamentului bolnavului se face prin urmărirea:

- a. poziției vicioase în pat în funcție de afecțiune
- b. activitatea zilnică a bolnavului
- c. expresia feței
- d. activitatea verbală
- e. starea psihică

Răspuns: a, c, e

234. Diagnosticul clinic al stopului cardiac ar fi susținut de:

- a. dispariția pulsului la arterele mari (carotidă, femurală)
- b. complexe QRS deformate sau disociație electromecanică sau lipsa activității electrice pe EKG
- c. mioză bilaterală
- d. oprirea respirației care este precedată de suspine
- e. starea de letargie

Răspuns: a, b, d

235. Succesul resuscitării cardio-respiratorie-cerebrală (R.C.R.C) constă în:

- a. viteza efectuării terapiei de resuscitare
- b. R.C.R.C să se efectueze în maxim 4 minute
- c. terapia definitivă în 8 minute
- d. să existe minim 3 resuscitatori
- e. să se efectueze numai de cadre medicale

Răspuns: a, b, c

236. Resuscitarea cardio-respiratorie presupune:

- a. tehnici care se referă personalului medical
- b. tehnici de management definitive ale stopului cardiac
- c. intervenție farmacologică
- d. tehnici care se referă personalului nemedical
- e. numai tehnici electronice de resuscitare

Răspuns: a, b, c

237. Starea terminală presupune decompensarea acută a funcțiilor vitale care duc la:

- a. pierderea presiunii sanguine
- b. capitalului venos
- c. conștienței
- d. capitalului arterial
- e. circulației și respirației

Răspuns: a, c, e

238. Moartea clinică se manifestă prin:

- a. absența pulsului periferic
- b. absența respirației
- c. absența pulsului la arterele mari
- d. petele cadaverice
- e. necroza ireversibilă a creierului

Răspuns: b, c, d

239. Etiologia infarctului miocardic (I.M.) acut este:

- a. embolia arterelor coronare
- b. dezechilibru între cerințe și aport de O<sub>2</sub>
- c. afecțiuni hepatice
- d. procese inflamatorii
- e. intoxicație cu alcool

Răspuns: a, b, d

240. Majoritatea I.M. (infarct miocardic) survin în orele de dimineață (jurul orei 9) deoarece:

- a. cresc catecolaminele plasmatice
- b. scad catecolaminele plasmatice
- c. crește nivelul cortizolului
- d. scade nivelul cortizolului
- e. crește agregarea trombocitară

Răspuns: a, c, e

241. Durerea simptomul principal în I.M., este variabilă ca intensitate de la caz la caz și are următoarele caracteristici:

- a. insuportabilă
- b. scurtă 1-2 minute
- c. sfâșietoare
- d. presiune ușoară
- e. caracter de înjunghiere

Răspuns: a, c, e

242. Sediul și iradierea durerii în I.M. este:

- a. interscapular
- b. precordial
- c. lombar
- d. iradiază în brațe
- e. paraombilical

Răspuns: a, b, d

243. Tabloul clinic al I.M. se caracterizează prin:

- a. agitație psihomotorie
- b. șoc
- c. hipertensiune arterială
- d. tegumente reci și umede
- e. tahicardie

Răspuns: b, d, e

244. Modificările aparatului respirator în I.M. se caracterizează prin:

- a. frecvența respirațiilor scăzută
- b. frecvența respirațiilor crescută
- c. dispnee cu respirație Cheyne-Stokes
- d. dispnee cu respirație Biot
- e. raluri umede crepitante și subcrepitante

Răspuns: b, c, e

245.Examenul aparatului digestiv în I.M. relevă:

- a. splenomegalie
- b. durere epigastrică
- c. HDS (hemoragie digestivă superioară)
- d. hepatomegalie
- e. reflux hepato-jugular

Răspuns: b, d, e

246.OMS a impus pentru diagnosticul cert de I.M. să fie prezente 2 din cele 3 criterii specifice. Care sunt cele 3 criterii?

- a. durere retrosternală tipică
- b. modificări EKG în dinamică
- c. hepatomegalie
- d. reflux hepato-jugular
- e. creșterea și scăderea markerilor serici

Răspuns: a, b, e

247.Explorarea izotopică în I.M. evidențiază:

- a. diagnosticul pozitiv al necrozei miocardice acute cu ajutorul trasorilor radioactivi cu tropism pentru țesutul necrotic (pată fierbinte)
- b. performanța ventricolelor
- c. diagnosticul unor complicații
- d. apreciază regurgitarea mitrală și tricuspida
- e. arată circulația colaterală

Răspuns: a, b, c

248.Ecografia Doppler în I.M. apreciază:

- a. pereții ventricolului stâng în plan longitudinal
- b. ruptura septului interventricular
- c. regurgitarea mitrală și tricuspida
- d. diagnosticul unor complicații
- e. prezența trombilor în ventricol

Răspuns: b, c, e

**249.**Rezonanța magnetică în I.M. pune în evidență:

- a. mărimea infarctului
- b. circulația colaterală
- c. funcția ventricolului stâng
- d. prezența trombilor în ventricol
- e. regurgitarea mitrală și tricuspida

Răspuns: a, b, c

**250.**Măsurile rapide care se iau în I.M. în faza prespital sunt:

- a. se anunță salvarea cu echipa antișoc
- b. se administrează diazepam
- c. se așează bolnavul în repaus absolut
- d. nifedipină sublingual
- e. se transportă bolnavul după ce a fost stabilizat hemodinamic la spital unde tratamentul de urgență se face după un algoritm prestabilit

Răspuns: a, c, e

**251.**Tratamentul bolnavului cu I.M. la spital se efectuează cu:

- a. diuretice
- b. analgetice majore
- c. oxigenoterapie + heparinoterapie
- d. tromboliza coronariană cu streptokinază în primele 6 ore în perfuzii i.v.
- e. fenobarbital

Răspuns: b, c, d

**252.**Complicațiile I.M. sunt:

- a. hipertensiunea arterială
- b. abdomenul acut
- c. șocul cardiogen
- d. tulburările de ritm cardiac
- e. insuficiența ventriculară stângă

Răspuns: c, d, e

**253.**Etiologia IM este:

- a. utilizarea drogurilor simpaticolitice
- b. feocromocitomul
- c. obezitatea
- d. eclampsia
- e. stresul

Răspuns: b, d, e

**254.**Tabloul clinic al HTA se caracterizează prin următoarele simptome:

- a. presiunea arterială sistolică  $>140\text{mmHg}$
- b. hipoaldosteronism
- c. modificări renale: oligurie, hematurie, azotemie, proteinurie
- d. modificări ale fundului de ochi (F.O.), hemoragii, edeme, exudate
- e. agitație psihomotorie

Răspuns: a, c, d

**255.**Tratamentul HTA se face cu :

- a. meprobamat
- b. nifedipină
- c. metoprolol
- d. digoxin
- e. nitroglicerină

Răspuns: b, c, e

**256.**Poziția corectă în pat a bolnavului cu insuficiență cardiacă este:

- a. semișezândă
- b. Trendelenburg
- c. decubit lateral stâng
- d. așezat pe marginea patului cu picioarele atârdate
- e. și-o alege cum dorește, nu i se impune

Răspuns: a, d, e

**257.**Alimentația bolnavului cardiac cuprinde:

- a. toți compușii principali alimentari plus vitamine și minerale
- b. aport scăzut de potasiu
- c. numai două mese/zi
- d. mese mici și dese
- e. nu se administrează alimente care produc distensie abdominală

Răspuns: a, d, e

**258.**În lipsa târgilor pentru transportul primar al bolnavilor se pot improviza și alte mijloace:

- a. bare de fier
- b. scaune cu spătare
- c. pături, covoare fixate pe bare de lemn
- d. băncuțe
- e. aripile ușilor

Răspuns: b, c, e

**259.**Mijloacele de transport al bolnavilor vor fi dotate cu:

- a. masă de operație
- b. electrocauter pentru hemostază
- c. aparate de respirație artificială și oxigen
- d. defibrilatoare
- e. trusă de urgență și medicamente

Răspuns: c, d, e

**260.**Transportul secundar al unui bolnav se referă la:

- a. transportul bolnavului dintr-un spital în altul
- b. transportul bolnavului de la domiciliu la spital
- c. transportul bolnavului intersecții
- d. transportul bolnavului din autosanitară în UPU
- e. transportul bolnavului din spital la domiciliu

Răspuns: a, c, e



**261.**Măsurile de siguranță pentru bolnav care se iau în timpul transportului interspitalicesc pentru prevenirea complicațiilor sunt:

- a. se va verifica hemostaza
- b. se va verifica starea de conștiență
- c. pansamentele și aparatele de imobilizare
- d. documentele medicale
- e. documentele personale ale bolnavului

Răspuns: a, c, d

**262.**Transportul intersecției se face de către brancardieri însoțiți de personal medical și cuprinde obligatoriu următoarele categorii de bolnavi:

- a. toți bolnavii care au suferit o fractură
- b. insuficiența cardio-respiratorie gravă
- c. bolnavii cu afecțiuni renale
- d. bolnavii cu infarct miocardic
- e. bolnavii cu tulburări de echilibru și tulburări nervoase

Răspuns: b, d, e

**263.**Transportul nou-născuților și a sugariilor se face numai cu însoțitor și pentru următoarele afecțiuni:

- a. boală diareică
- b. febrili
- c. cu afecțiuni respiratorii și cardiace
- d. septicemii
- e. cu afecțiuni chirurgicale care necesită intervenție chirurgicală

Răspuns: c, d, e

**264.**În comă se păstrează în mod relativ funcțiile vieții vegetative și anume:

- a. deglutiția
- b. respirația
- c. circulația
- d. schimburile nutritive și secrețiile
- e. auzul

Răspuns: b, c, d

**265.**Tabloul clinic al șocului anafilactic se manifestă prin:

- a. hipertensiune arterială
- b. mioză
- c. urticarie generalizată + edeme
- d. edem glotic + spasm glotic
- e. incontinență urinară + fecale

Răspuns: c,d,e

**266.**Semnele clinice ale șocului hemoragic sunt:

- a. tegumente și mucoase palide, marmorate, reci, umede, cianotice
- b. bradipnee
- c. PVC (presiune venoasă centrală) crescută
- d. tahicardie + hipotensiune
- e. sete

Răspuns: a,d,e

**267.**Soluțiile cristaloide sunt:

- a. dextranul
- b. serul fiziologic 9‰
- c. soluțiile de glucoză 5%, 10%...
- d. reomacrodexul
- e. soluția Ringer

Răspuns: b, c, e

**268.**Caracterul durerii în abdomenul acut se caracterizează prin:

- a. durere abdominală intensă
- b. instalarea durerii brusc
- c. durerea are o durată de câteva ore până la 2-3 zile
- d. durerea abdominală instalată lent apoi brusc
- e. durerea abdominală prezintă 2-3 ore după care cedează

Răspuns: a,b,c

**269.** Semnele clinice în apendicita acută sunt:

- a. durerea apare în primul rând periombilical sau în epigastru apoi după câteva ore se localizează în fosa iliacă dreaptă
- b. manevra Blumberg pozitivă
- c. grețuri și vărsături
- d. durerea iriază în membrul inferior drept
- e. constipație (mai des la copii)

Răspuns: a,b,c

**270.** Simptomatologia ocluziei intestinale este:

- a. durere abdominală colicativă cu mici pauze de 10-15 minute
- b. oprirea tranzitului intestinal pentru gaze și materii fecale
- c. deshidratare globală
- d. hemoragie digestivă
- e. fibrilație atrială

Răspuns: a,b,c

**271.** Semnele clinice ale pancreatitei acute necrotico-hemoragice sunt:

- a. convulsii
- b. vărsături bilioase, apoase, în zaț de cafea sau sânge proaspăt
- c. tranzit intestinal accelerat
- d. abdomen meteorizat, balonat
- e. hipotensiune arterială sau chiar prăbușirea ei

Răspuns: b,d,e

**272.** Semnele clinice pentru stabilirea diagnosticului de colica biliară sunt:

- a. astenie marcată
- b. durere în hipocondrul drept și epigastru (semnul Murphy pozitiv)
- c. tranzit intestinal accelerat
- d. sindrom dispeptic
- e. cefalee

Răspuns: b,d,e

273. Factorii multipli, dificili care împiedică de multe ori salvarea unui politraumatizat sunt:

- a. debutul brusc al evenimentelor
- b. voluntari necalificați care intervin cu bună intenție la locul accidentului, dar nu au cunoștințe medicale
- c. severitatea și varietatea leziunilor
- d. personal medical de urgență care nu cunoaște manevrele de resuscitare
- e. absența medicamentelor și materialelor sanitare din autosanitară

Răspuns: a,b,c

274. Bolile care produc moartea subită sunt:

- a. bolile coronariene
- b. insuficiență renală
- c. insuficiență cardiacă
- d. instabilitate neuromorală
- e. tulburările hidroelectrolitice

Răspuns: a,d,e

275.\* În bronșita cronică principalul simptom este:

- a. tusea și expectorația
- b. durerea precordială
- c. durerea toracică
- d. frisonul
- e. astenia

Răspuns: a

276.\* Debutul pneumoniei pneumococice este marcat de:

- a. frison solemn urmat de junghi toracic și febră
- b. pleurezie
- c. wheezing-ul respirator
- d. hemoptizia
- e. dispneea paroxistică expiratorie

Răspuns: a

277.\*Tratamentul crizei de angină pectorală începe cu:

- a. administrarea de Nitroglicerină sublingual
- b. efectuarea testului de efort
- c. tratament perfuzabil cu clorura de potasiu
- d. administrarea de antibiotice
- e. administrarea de Miofilin

Răspuns: a

278.\*În hipertensiunea arterială regimul alimentar prescris este:

- a. hiposodat
- b. bogat în grăsimi animale
- c. cu un număr mare de calorii
- d. cu un număr mare de glucide
- e. hipersodat

Răspuns: a

353.Pneumonia poate fi diagnostică la vârstnici prin :

- a. alterarea stării generale
- b. anorexie
- c. confuzie
- d. tahicardia și tahipnee
- e. poliurie

Răspuns: a, b, c, d

354.Hemoptizia poate sugera următoarele afecțiuni:

- a. Bronșita acută
- b. neoplasm pulmonar,
- c. TBC pulmonar avansat
- d. bronhopneumonie
- e. astm bronșic

Răspuns: b, c

**355.**Dispneea instalată progresiv poate sa apară în:

- a. Pleurezii
- b. pneumonii
- c. aspirarea de corpi străini în căile respiratorii
- d. tromboembolismul pulmonar
- e. pneumotorax

Răspuns: a, b

**356.**Cauzele edemelor simetrice ale membrelor inferioare pot fi:

- a. staza venoasa cronică
- b. sindroamele de compresiune intra abdominale
- c. limfedemul cronic
- d. hipoproteinemiile severe
- e. tromboflebita profundă de gambă

Răspuns: a, b, c, d

**357.**Tratamentul nefarmacologic al TA (prin măsuri igienodietetice) este indicat:

- a. la toți pacienții hipertensivi,
- b. la cei cu istoric familial de hipertensiune
- c. cei cu hipertensiune de graniță
- d. doar la hipertensivi
- e. doar la cei cu hipertensiune de graniță

Răspuns: a, b, c

**358.**Ortopneea se caracterizează prin faptul ca:

- a. apare când bolnavul este culcat
- b. pacientul sta la marginea patului cu sete de aer
- c. apare insuficiența ventriculară stângă
- d. apare în timpul efortului
- e. apare după efort

Răspuns: b, c

**363.** Criza de astm bronșic este definită de:

- a. accese de dispnee bradipneica expiratorie
- b. wheezing
- c. tuse spastică sau cu expectorație aderentă, perlata
- d. caracterul reversibil al episodului de dispnee
- e. aspect radiologic de condensare pulmonară

Răspuns: a, b, c, d

**364.** Stabilirea volumului diurezei este important pentru:

- a. stabilirea rației calorice
- b. stabilirea bilanțului hidric
- c. evaluarea funcțională a aparatului renal
- d. determinarea sedimentului urinar
- e. evaluarea morfo-funcțională a aparatului digestiv

Răspuns: b, c

**365.** Precizați care afirmație este adevărată:

- a. dezinfecția tegumentelor se efectuează înainte de puncția venoasă
- b. dezinfecția tegumentelor se efectuează în timpul puncției venoase
- c. dezinfecția tegumentelor se efectuează după puncția venoasă
- d. garoul se aplică înainte de puncția venoasă
- e. garoul se aplică după puncția venoasă

Răspuns: a, d

**366.\*** VSH-ul se determină din:

- a. sânge arterial
- b. sânge capilar
- c. sânge venos
- d. urina de dimineață
- e. urina colectată în 24 ore

Răspuns: c

**367.** \*Valoarea normală a glicemiei este de:

- a. 80-110 mg %
- b.  $41 \pm 5$  %
- c. 11-15 g%
- d. 12-17 mm/2 h
- e. 10-15 ‰

Răspuns: a

**368.** Hemocultura se recoltează:

- a. obligatoriu postprandial
- b. de regula înainte de administrarea antibioticelor
- c. obligatoriu à jeune (pe nemâncate)
- d. de regulă în plin frison sau puseu febril
- e. după masa de dimineață

Răspuns: b, d

**369.** Exudatul faringian se recoltează:

- a. postprandial
- b. de regulă dimineața
- c. înainte de administrarea antibioticelor
- d. de regulă în plin frison sau episod febril
- e. înainte ca bolnavul să bea, mănânce sau să se spele pe dinți

Răspuns: b, c, e

**370.** \*Urocultura se recoltează din:

- a. urina colectată în decurs de 3 ore
- b. urina colectată dimineața di jetul mijlociu
- c. urina colectată à jeune
- d. urina colectată în 24 ore
- e. diureza pe 24 de ore

Răspuns: b



**371.** Medicamentele se administrează pe acea cale de administrare:

- a. utilizată și la alți bolnavi
- b. indicată de medicul curant
- c. menționată zilnic în fișa bolnavului
- d. solicitată de bolnav
- e. indicată de farmacistul spitalului

Răspuns: b, c

**372.** Ritmul de administrare al medicamentelor este:

- a. menționat zilnic în fișa bolnavului
- b. cel utilizat și de alți bolnavi
- c. indicat de farmacistul spitalului
- d. indicat de medicul curant
- e. cel solicitat de bolnav

Răspuns: a, d

**373.** Doza de medicamente administrată unui bolnav este:

- a. menționată zilnic în fișa bolnavului
- b. cea utilizată și la alți bolnavi
- c. menționată în rețeta prescrisă de medic
- d. indicată de medicul curant
- e. cea solicitată de bolnav

Răspuns: a, c, d

**374.** \*Pentru a-si pastra proprietatile insulina se păstrează:

- a. în dulapuri închise cu cheie
- b. în dulapuri uscate
- c. în farmacie
- d. în frigider
- e. în locuri ferite de lumină sau căldură

Răspuns: d

**375.\***Medicamentele injectabile se administrează:

- a. înainte de masă
- b. după masă
- c. imediat după preparare și/sau aspirarea în seringă
- d. per os
- e. imediat după ce au fost scoase din farmacie

Răspuns : c

**376.\***Medicamentele se administrează:

- a. în funcție de prescripția medicală (rețeta sau foaia de tratament)
- b. doar a jeune
- c. doar postprandial
- d. după 24 de ore de la extragerea din ambalajul original
- e. după 24 de ore de la eliberarea din farmacie

Răspuns: a

**377.** Asistentul medical trebuie să verifice înainte de administrarea unei doze:

- a. aspectul medicamentului
- b. integritatea ambalajului
- c. firma producătoare a medicamentului
- d. data fabricației
- e. doza zilnică prescrisă

Răspuns: a, b, d, e

**378.** Scopul administrării medicamentelor poate fi:

- a. tratamentul simptomatic
- b. tratamentul profilactic
- c. tratamentul etiologic
- d. tratamentul patogenic
- e. explorator

Răspuns: a, b, c, d

**379.**Elementele care se urmăresc la monitorizarea funcției respiratorii sunt:

- a. frecvența respirațiilor pe minut
- b. amplitudinea mișcărilor respiratorii
- c. aspectul pulsului arterial
- d. oximetria
- e. simetria mișcărilor respiratorii

Răspuns: a, b, d, e

**380.\***Tulburările de micțiune sunt următoarele cu excepția:

- a. retenția acută de urină
- b. tulburări calitative ale urinei
- c. incontinența urinară
- d. retenția cronică de urină
- e. polakiuria și disuria

Răspuns: b

**381.**Caracterele calitative ale urinei sunt definite de:

- a. culoare
- b. miros
- c. aspect
- d. cantitate
- e. micțiune

Răspuns: a, b, c

**382.**Precizați dacă mișcările involuntare din afecțiunile descrise sunt corecte:

- a. tremor muscular ritmic în bolile cardiace
- b. tremor muscular ritmic în boli renale
- c. convulsiile prezente în boli ale rinichiului
- d. convulsiile pot fi prezente în boli ale SNC
- e. tremorul muscular involuntar caracterizează Maladia Parkinson

Răspuns: d, e

**404.**Tuberculoza:

- a. este o boala infecto-contagioasă
- b. are răspândire în principal aeriană
- c. afectează cu predilecție plămânul
- d. se poate localiza și în alte țesuturi și organe
- e. nu este contagioasa

Răspuns : a, b, c, d

**405.**Transmiterea TBC se poate face prin :

- a. contact direct, prelungit cu bolnavul (intra familial)
- b. pe cale aeriană, prin picăturile lui Pflugge
- c. prin consum de lapte sau preparate din lapte contaminate, insuficient prelucrate termic (*Mycobacterium Bovis*)
- d. prin obiecte contaminate cu secreții (spută), provenite de de la bolnavi cu leziuni deschise (rar).
- e. prin preparate de sânge contaminate

Răspuns : a, b, c, d

**406.**Durerea din angina pectorală stabila:

- a. apare la efort
- b. cedează la repaus
- c. cedează rapid la nitroglicerină
- d. este localizată retrosternal
- e. cedează la efort

Răspuns : a, b, c, d

**407.**Infecțiile tractului urinar la vârstnici:

- a. pot să fie afebrile
- b. pot sa nu fie insotite de tabloul clinic tipic
- c. pot fi sugerate de alterarea stării generale
- d. sunt insotite de sindrom metabolic
- e. pot fi insotite de anorexie, oboseală excesivă

Răspuns : a, b, c, e

**408.** Complicațiile osteoporozei sunt cu excepția:

- a. osteoartroza degenerativă
- b. dureri articulare
- c. tasari vertebrale
- d. fractura netraumatică
- e. tromboflebita

Răspuns : a, e

**409.** Eliminarea secrețiilor pulmonare este favorizată prin:

- a. Dieta
- b. Tuse și expectorație
- c. Aerosoli cu substanțe cu rol expectorant
- d. Drenaj postural legat de poziționarea bolnavului în pat
- e. Hidratarea corespunzătoare a bolnavului

Răspuns : b, c, d, e

**410.\*** Oxigenul se administrează obligatoriu în caz de:

- a. scădere a hemoglobinei (anemie)
- b. creștere a hemoglobinei (poliglobulie)
- c. hipertermie
- d. scăderea saturației cu  $O_2$
- e. deshidratare

Răspuns : d

**411.\*** Cea mai frecvent agent implicat în boala diareică acută virală la copil este:

- a. adenovirusul
- b. rotavirusul
- c. pestivirusul
- d. astrovirusul
- e. parvovirusul

Răspuns: b

**452.**Antibioterapia se introduce în boala diareică acută în următoarele situații:

- a. diaree cu mucus
- b. diaree cu sânge
- c. stări de malnutriție
- d. sugar alimentat artificial
- e. sugar eutrofic, stare generală bună

Răspuns: a, b, c, d

**453.** Epiglotita acută se caracterizează prin:

- a. febră înaltă
- b. sialoree
- c. disfagie
- d. voce stinsă
- e. wheezing

Răspuns: a, b, c, d

**454.** Rinofaringita acută se manifestă la sugar prin:

- a. febră moderată
- b. obstrucție nazală
- c. wheezing
- d. agitație
- e. rinoree

Răspuns: a, b, d, e

**455.** Complicațiile Infecțiilor.Acute.Cai.Respiratorii .Superioare. includ:

- a. otită
- b. sinuzită
- c. laringită
- d. traheobronșită
- e. edem alergic

Răspuns: a, b, c, d

**456.** Convulsiile febrile:

- a. apar în context febril
- b. la sugarul sub 6 luni
- c. au durată sub 15 minute
- d. nu asociază anomalii neurologice în perioada intercritică
- e. febra nu se datorează unei infecții a SNC

Răspuns: a, c, d, e

**457.\*** Tratamentul crizei de convulsii febrile se face cu:

- a. Diazepam 0,3-0,5 mg/kg/zi
- b. Miofilin
- c. Fenobarbital 1-2 mg/kg/zi
- d. Aspirină 200 mg/kg/zi
- e. Paracetamol 100 mg/kg/zi

Răspuns: a

Răspuns: a, b, c, d

**463.\*** Contraindicațiile alimentației naturale ce țin de factorul matern sunt:

- a. Insuficiența cardiacă
- b. Insuficiența renală
- c. Tuberculoza activă
- d. Infecția HIV
- e. Toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: e

**468. \*** Alimentația mixtă se definește ca:

- a. introducerea sucului de fructe în alimentația sugarului
- b. administrarea de lapte de mama și lapte de vacă la mese diferite
- c. administrarea de lapte de mama și suc de fructe
- d. administrarea de lapte de vacă și suc de fructe
- e. administrarea de lapte praf și suc de fructe

Răspuns: b

- 469.** Laptele de mama are urmatoarele calitati:
- a. alimentul ideal pentru crestere si dezvoltare
  - b. usor de administrat
  - c. permite o dezvoltare neurosenzoriala optima
  - d. temperatura optima
  - e. creste riscul pentru AB, HTA, diabet zaharat

Răspuns: a, b, c, d

- 470.** Ce vaccinuri se pot efectua la sugar:
- a. antirujeolic
  - b. anti virus imunodeficienta umana (anti HIV)
  - c. antitetanos
  - d. antipertusis
  - e. antidifteric

Răspuns:a, c, d, e

- 493.** Angina acută streptococică poate fi sugerată de următoarele semne clinice:
- a. hiperermie faringiană intensă cu microvezicule
  - b. hiperermie faringiană intensă
  - c. conjunctive hiperemice
  - d. depozite pultacee
  - e. adenopatie subangulomandibulară

Răspuns: b, d, e

- 494.** Stomatita micotica:
- a. este determinata de candida albicans
  - b. mucoasa bucala este cafenie
  - c. depozitele de pe mucoasa sunt maronii
  - d. depozitele sunt usor de inlaturat
  - e. tentativa de inlaturare a depozitelor e urmata de sangerari

Răspuns: a, e



**495.** In diareea acuta a copilului mic se permit urmatoarele alimente:

- a. laptele de vaca
- b. smantana
- c. banana
- d. orez
- e. mazare

Răspuns: c, d

**543.** Testul PAP se caracterizează prin:

- a. are 5 clase
- b. stabilește singur diagnosticul de cancer de col uterin
- c. este urmat de alte investigații paraclinice dacă este anormal
- d. este o metodă de screening
- e. este foarte scump

Răspuns: a, c, d

**544.** Cauzele incontinenței urinare de efort sunt:

- a. multiparitatea
- b. rupturile perineale
- c. leucoreea
- d. fibromu uterin
- e. endometrioza

Răspuns: a, b

**545.** Forma gravă a vărsăturilor gravidice:

- a. cuprinde 3 faze, cu gravitate crescândă
- b. determină modificări metabolice
- c. poate duce la întreruperea terapeutică a sarcinii
- d. răsunetul asupra organismului matern este minor
- e. repausul fizic și psihic sunt suficiente

Răspuns: a, b, c

**546.** Pancreatita acută este caracterizată de?

- a. durere în bară în etajul abdominal superior
- b. creșterea amilazelor sangvine
- c. dureri intense hipogastrice
- d. scăderea amilazelor
- e. creșterea bilirubinei indirecte

Răspuns: a, b

**578.\*** Semnul “cojii de portocală” este caracteristic pentru?

- a. tumorile benigne mamare
- b. inflamațiile acute mamare
- c. neoplasmul mamar cu extensie subtegumentară
- d. fibroadenomul mamar
- e. abcesul mamar cronic

Răspuns: c

**579.** Ginecomastia este?

- a. hipertrofia glandei mamare la femei în menopauză
- b. hipertrofia glandei mamare la fetițe
- c. hipertrofia glandei mamare la bărbați
- d. hipertrofia glandei mamare la femei gravide
- e. atrofia glandei mamare

Răspuns: c

**580.** Semnele clinice caracteristice pentru peritonite sunt ?

- a. greața
- b. apărarea musculară
- c. oprirea tranzitului
- d. contractura musculară
- e. distensia abdominală

Răspuns: b, d

**581.** Semnele clinice ale ocluziilor intestinale includ ?

- a. oprirea tranzitului intestinal pentru fecale și pentru gaze
- b. vărsături
- c. abdomen excavat
- d. dureri abdominale
- e. distensie abdominală

Răspuns: a, b, d, e

**584.\*** Pneumoperitoneul apare la Rx abdominal pe gol în ?

- a. icter mecanic
- b. ulcer duodenal în puseu algic acut
- c. apendicită acută perforată
- d. ulcer gastric sau duodenal perforat
- e. ocluzie intestinală

Răspuns corect: d

**585.\*** Nivelele hidroaerice apărute pe Rx-ul abdominal sunt caracteristice pentru ?

- a. peritonita
- b. pancreatita acută
- c. icter mecanic
- d. ocluzie intestinală
- e. gastroduodenită acută

Răspuns: d

**586.\*** Varicele sunt?

- a. dilatații fusiforme ale venelor profunde
- b. dilatații și alungiri ale venelor superficiale ale membrului superior
- c. dilatații anevrismale, sacciforme ale venelor superficiale ale membrului inferior
- d. dilatații ale venelor jugulare

Răspuns corect: c

**587.**Apa oxigenată are efect:

- a. hemostatic
- b. oxidant
- c. virulicid
- d. bactericid
- e. fungicid

Răspuns: a, b, d

**588.\***Betadina nu este indicată la:

- a. spălatul mâinilor
- b. spălături vaginale
- c. spălături bucale
- d. toaleta plăgilor
- e. dezinfecție în general

Răspuns: e

**589.**Infecțiile nosocomiale se previn prin:

- a. spalarea mainilor
- b. evitarea supraaglomerării secției
- c. curățenie și dezinfecție zilnică și terminală
- d. evitarea toaletei zilnice la toți nou născuții
- e. alimentare corespunzătoare

Răspuns: a,b,c

**590.**Bioetica:

- a. cuprinde doar etica medicală tradițională
- b. se focalizează numai asupra omului
- c. cuprinde și biosfera în întregul ei
- d. cuprinde orice intervenție științifică a omului asupra vieții în general
- e. are 5 ramuri

Răspuns: c,

**591.**Etica Medicală:

- a. a fost doar apanajul Bisericii catolice
- b. a fost o preocupare și a celorlalte confesiuni religioase creștine
- c. nu a avut răsunet în lumea islamică
- d. face parte din tematica abordată în centrele de bioetică
- e. nu este relevantă pentru actul medical

Răspuns: b, d

**592.**Competența bioetică este recunoscută în:

- a. problemele etice ale profesiunilor sanitare
- b. problemele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om
- c. problemele sociale legate de problemele politicii sanitare și de medicina locurilor de muncă
- d. politici de planificare familială și control demografic
- e. probleme privind intervenția asupra vieții altor ființe vii decât omul

Răspuns: a, b, c, d, e

**593.**Finalitatea bioetică constă în:

- a. analiza rațională a problemelor morale legate de biomedicină
- b. conexiunea problemelor morale cu dreptul
- c. conexiunea problemelor morale cu științele sociale
- d. liniile etice nu au o finalitate aplicativă
- e. liniile etice au întotdeauna o finalitate aplicativă

Răspuns: a, b, c, e

**594.**În cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se vor explica:

- a. beneficiile posibile pentru alții și pentru știință
- b. dosarele studiului vor putea fi vizualizate de către angajator
- c. obligația individului de a continua implicarea în studiu, odată ce a acceptat înrolarea
- d. pe cine să contacteze pentru întrebări în legătură cu cercetarea sau cu posibilitatea apariției unei lezări din cauza cercetării
- e. posibilele efecte nedorite ale terapiei cercetate

Răspuns: a, d, e

**595.**Principiile speciale ale transplantului de țesuturi și/sau organe sunt:

- a. să respecte demnitatea persoanei (donator, primitor, medic)
- b. să aibă scop terapeutic
- c. să respecte drepturile omului
- d. să nu fie determinat de oportunități politice sau economice
- e. poate avea scop pur științific

Răspuns: a, b, c, d

**596.**Donarea de organe trebuie să respecte o serie de principii:

- a. principiul respectării demnității umane
- b. principiul anonimatului donatorilor
- c. principiul gratuității
- d. principiul “primum non nocere”
- e. principiile se respecta doar pentru donator, nu și pentru primitor

Răspuns: a, b, c, d

**597.**Ce înseamnă „medicina genomică”?

- a. cunoașterea codului genetic al omului
- b. structura patrimoniului ereditar
- c. știința care studiază tipurile de sol
- d. posibilitatea cunoașterii constituției ereditare
- e. medicina care folosește cunoștințele legate de codul genetic uman

Răspuns: a, b, d, e

**598.**Eutanasia activa:

- a. este legală în România
- b. nu este legală în România
- c. este legală în unele state ale UE
- d. a fost legală în Statele Unite ale Americii
- e. înseamnă decuplarea unui bolnav comatos de la aparatele de susținere vitală

Răspuns: b, c, d

**599.**În cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se vor explica:

- a. natura experimentală și scopul studiului
- b. faptul că participarea este voluntară
- c. procedura
- d. disconfortul și riscurile testelor atât pentru individ, cât și pentru familie
- e. sfatul genetic precizează exact dacă fatul va avea sau nu boala genetică

Răspuns: a, b, c, d

**600.**Zona zoster oftalmică:

- a. e produsă de virusul herpes simplex I
- b. poate să dea complicații oculare
- c. e însoțită de dureri frontale intense
- d. se caracterizează prin apariția de vezicule la nivelul tegumentului pleoapelor
- e. e produsă de virusul varicelo-zosterian

Răspuns: b, c, d, e

**601.**Atitudinea de urgență în cazul arsurilor oculare constă în:

- a. îndepărtarea resturilor de substanță sau corp străin
- b. spălătura largă cu apă sau ser fiziologic
- c. administrare generală de antibiotic
- d. nu ne atingem de ochi și pansăm
- e. administrare locală de cortizon

Răspuns: a, b, c

**602.**Regiunile patogenice în scabie?

- a. interdigital
- b. pliul axilar
- c. periombilical
- d. pielea păroasă a capului
- e. fața laterală a gambelor

Răspuns: a,b,c

**603.** Rolul nurselor în promovarea sănătății este în următoarele domenii:

- a. sănătate ocupațională
- b. educație și recuperare cardiacă
- c. educație civică
- d. educație juridică
- e. Intervenția precoce

Răspuns: a,b,e

**604.** Intervențiile realizate de către nursă, pot fi :

- a. intervenții cognitive- educarea pacientului
- b. intervenții psiho-sociale- mecanisme de adaptare, de suport, de reducere a stresului
- c. Intervenții tehnice –proceduri de îngrijire a plagilor
- d. nu sunt necesare intervenții tehnice- proceduri de îngrijire a plăgilor, inserții de sonde
- e. nici una din afirmațiile de mai sus este adevărată

Răspuns: a,b,c

**605.** Simptomele accidentului vascular cerebral includ debutul brusc al:

- a. stări de amorțeală, slăbiciune sau paralizie a feței, brațului sau piciorului, de obicei pe o parte a corpului
- b. tranzit intestinal accelerat
- c. confuzie, tulburări de vorbire sau de înțelegere a cuvintelor celorlalți
- d. dureri de cap severe și tulburări severe la un ochi sau la ambii
- e. insomnii

Răspuns: a, c, d



**606.** Investigațiile necesare în depistarea accidentului vascular cerebral sunt:

- a. tomografia computerizată (CT)
- b. rezonanța magnetică (RMN)
- c. ecografia Doppler a arterelor carotide
- d. radiografie de craniu
- e. radiografia toracică

Răspuns: a, b, c